



**PROTOCOLES INFIRMIERS DE SOINS
D'URGENCE N°6
Hypoglycémie**

**SSSM
28 - 41 - 45**

Rédacteur :
Groupe de travail PISU
SSSM 28 - 41 - 45

Validation par :
Les médecins chefs
D'Eure et Loir, du Loiret, du Loir et Cher

Version du
06.03.2020

1. RECONNAISSANCE DE LA SITUATION :

- Malaise ou trouble de la conscience avec glycémie capillaire < 3,3 mmol/L (0,6 g / L).

2. BILAN INFIRMIER :

- S'assurer de la transmission du bilan secouriste.
- S'assurer de la mise en PLS si inconscient.
- Transmettre le bilan infirmier au médecin régulateur du SAMU ou le lui faire transmettre sans délai avec la notion d'hypoglycémie.

ANAMNESE :

- Antécédents notamment de diabète, traitements en cours, circonstances de survenue, prise d'alcool.

PARAMETRES VITAEUX :

- Fréquence cardiaque, pression artérielle non invasive, fréquence respiratoire, SpO2, état de conscience, glycémie capillaire.

SIGNES DE GRAVITE SPECIFIQUES A RECHERCHER :

- Trouble de conscience, crise convulsive.

3. ACTIONS ET ACTES INFIRMIERS :

- Utiliser la voie per os pour l'administration de glucose lorsque l'état de conscience le permet.
- En cas de trouble de conscience ou d'impossibilité d'utiliser la voie per os, Mettre en place une voie veineuse périphérique.
- Les experts proposent l'administration intraveineuse initiale de 20 à 40 ml de **GLUCOSE 30%**.
- Les experts proposent l'administration de glucagon intramusculaire en cas d'impossibilité d'administration per os ou intraveineuse de glucose.

4. SURVEILLANCE en attente d'une équipe médicale de réanimation pré hospitalière :

- Contrôler la glycémie capillaire après l'administration initiale de glucose et avant l'administration de dose complémentaire en cas de trouble de conscience persistant.
- **UNE FICHE INTERVENTION INFIRMIER SERA REDIGEE PAR L'ISP.**



**PROTOCOLES INFIRMIERS DE SOINS
D'URGENCE N°6
Hypoglycémie**


**SSSM
28 - 41 - 45**

Rédacteur :
Groupe de travail PISU
SSSM 28 - 41 - 45

Validation par :
Les médecins chefs
D'Eure et Loir, du Loiret, du Loir et Cher

Version du
06.03.2020

Victime d'un malaise avec glycémie < 0.6 gr/l (3.3 mmol)



Le Médecin Chef

Document formation PISU